

INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI CORSO DI SCIENZA DEI MATERIALI


COGNOME _____ NOME _____

Segnare con una crocetta la risposta (una sola) che si ritiene esatta. Alle risposte esatte verranno assegnati +4 punti mentre a quelle errate -1. Alle domande a cui non si risponde verrà assegnato un punteggio nullo. Non è consentita la consultazione di libri o appunti.

1 – Il valore della costante cinetica di reazione:

- A- è indipendente dalla temperatura
 B- aumenta con l'aumentare della temperatura solo se la reazione è esotermica
 C- decresce con l'aumentare della temperatura
 D- aumenta con l'aumentare della temperatura

2 – Indicare l'ordine complessivo della reazione:




sulla base dei seguenti dati sperimentali:

[H ₂]	[I ₂]	v
1,5 M	1,5M	3,6×10 ³ M s ⁻¹
1,5 M	3,0M	7,2×10 ³ M s ⁻¹
3,0 M	1,5M	1,4×10 ⁴ M s ⁻¹

- A - 1
 B - 0
 C - 3
 D - 2

3 – Quante moli di acido solforico si formano dalla reazione tra 4 moli di SO₂, 2 moli di O₂ e 3 moli di H₂O che si combinano secondo la reazione (da bilanciare):



- A - 2 moli
 B - 8 moli
 C - 4 moli
 D - 3 moli

4 – Un recipiente di un litro viene riempito completamente da 300 mg di CH₄ e 300 mg di O₂ e si misura una pressione totale di 0,60 atm. Qual è la temperatura del sistema ?

- A - 260 K
 B - 223 K
 C - 195 K
 D - 312 K

5 – L'acido formico, HCOOH, è un acido debole monoprotico con Ka=1,77×10⁻⁴. In un litro di soluzione acquosa sono sciolte 0,01 moli di formiato di sodio, HCOONa. Calcolare il pH della soluzione.

- A - 8,25
 B - 7,88
 C - 6,12
 D - 5,75

6 – Calcolare la costante crioscopica dell'etanolo (C₂H₅O) sapendo che l'etanolo puro congela a -117,3°C e che una soluzione ottenuta sciogliendo 5,0 g di C₆H₁₂O₆ in 100 g di etanolo congela a -117,9 °C.

- A - 5,40 °C/m
 B - 3,60 °C/m
 C - 1,80 °C/m
 D - 2,16 °C/m

Costanti utili

Numero di Avogadro, N = 6,022×10²³ ; Costante dei gas, R = 0,0821 L atm mol⁻¹ K⁻¹ = 8,314 J mol⁻¹ K⁻¹ ; Costante

di Rydberg=2,180×10⁻¹⁸ J Velocità della luce c=3,00×10⁸ m/s Costante di Planck h=6,63×10⁻³⁴ J·s

Costante di Faraday, F=96500 C/mol

IA IIA

IIIA IVA VA VIA VIIA

H 1,008																	He 4,00
Li 6,941	Be 9,012											B 10,81	C 12,01	N 14,01	O 16,00	F 19,00	Ne 20,18
Na 22,99	Mg 24,30											Al 26,98	Si 28,09	P 30,97	S 32,07	Cl 35,45	Ar 39,95
K 39,10	Ca 40,08	Sc	Ti 47,90	V	Cr 52,00	Mn 54,94	Fe 55,85	Co 58,93	Ni 58,69	Cu 63,55	Zn 65,39	Ga	Ge	As	Se	Br 79,90	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag 107,9	Cd	In	Sn 118,7	Sb	Te	I	Xe

A

Scrivere la struttura di Lewis dello ione **cianato** indicando anche esplicitamente le cariche formali dei vari atomi oltre che loro numero di ossidazione. Indicare inoltre i valori degli angoli di legame nonché l'ibridazione dell'atomo centrale (**6 punti**)