

INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI CORSO DI SCIENZA DEI MATERIALI

COGNOME _____ NOME _____

Segnare con una crocetta la risposta (una sola) che si ritiene esatta. Alle risposte esatte verranno assegnati +4 punti mentre a quelle errate -1. Alle domande a cui non si risponde verrà assegnato un punteggio nullo. Non è consentita la consultazione di libri o appunti.


1 - L'analisi elementare di un composto fornisce le seguenti percentuali in peso: K 28,2 %; Cl: 25,6 %; O: 46,2 %. Di quale dei seguenti composti si tratta?

- A - clorato di potassio
 B - ipoclorito di potassio
 C - clorito di potassio
 D - perclorato di potassio

2 - Data una soluzione acquosa 0,5 M di acido nitrico, calcolare la percentuale in peso di acido nitrico, sapendo che la densità della soluzione è 1,09 g/mL

- A - 5,6 %
 B - 10,7 %
 C - 30,0 %
 D - 2,9 %

3 - Si consideri la reazione



Quanti grammi di $\text{CS}_2(\text{g})$ devono essere fatti reagire per avere 20 litri di SO_2 a $P=4,0 \text{ atm}$ e a $T= 100^\circ\text{C}$?

- A - 198 g
 B - 261 g
 C - 99,0 g
 D - 397 g

4 - L'acido formico, HCOOH , è un acido debole monoprotico con $K_a=1,77 \times 10^{-4}$. In un litro di soluzione acquosa sono sciolte 0,01 moli di formiato di sodio, HCOONa . Calcolare il pH della soluzione.

- A - 5,75
 B - 6,12
 C - 7,88
 D - 8,25

5 - L'elettronegatività è ...

- A- l'energia di una mole di elettroni
 B- la tendenza di un elemento ad attrarre gli elettroni di legame
 C- la tendenza di un elemento a respingere gli elettroni di legame
 D- l'energia necessaria per strappare un elettrone dal guscio di valenza di un elemento

6 - Quale dei seguenti sali di $\text{Ag}(\text{I})$ presenta la solubilità più bassa?

- A - solfato, $K_{ps} = 1,70 \times 10^{-5}$
 B - carbonato, $K_{ps} = 8,13 \times 10^{-12}$
 C - cianuro, $K_{ps} = 1,20 \times 10^{-16}$
 D - fosfato, $K_{ps} = 1,40 \times 10^{-18}$

Costanti utili

Numero di Avogadro, $N = 6,022 \times 10^{23}$; Costante dei gas, $R = 0,0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$; Costante

di Rydberg= $2,180 \times 10^{-18} \text{ J}$ Velocità della luce $c=3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ Costante di Planck $h=6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

Costante di Faraday, $F=96500 \text{ C/mol}$


IA IIA

IIIA IVA VA VIA VIIA

H 1,008																	He 4,00
Li 6,941	Be 9,012											B 10,81	C 12,01	N 14,01	O 16,00	F 19,00	Ne 20,18
Na 22,99	Mg 24,30											Al 26,98	Si 28,09	P 30,97	S 32,07	Cl 35,45	Ar 39,95
K 39,10	Ca 40,08	Sc	Ti 47,90	V	Cr 52,00	Mn 54,94	Fe 55,85	Co 58,93	Ni 58,69	Cu 63,55	Zn 65,39	Ga	Ge	As	Se	Br 79,90	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag 107,9	Cd	In	Sn 118,7	Sb	Te	I	Xe

A

Scrivere la struttura di Lewis dello ione **carbonato** indicando anche esplicitamente le cariche formali dei vari atomi oltre che il numero di ossidazione dell'atomo di carbonio. Indicare inoltre i valori degli angoli di legame nonché l'ibridazione dell'atomo centrale (**6 punti**)



IBRIDAZIONE C sp^2

N.OX C = +4